

ADL	activities of daily living	日常生活動作
AVF	arteriovenous fistula	自己血管使用皮下動静脈瘻
AVG	arteriovenous graft	人工血管使用皮下動静脈瘻
BMI	body mass index	
BUN	blood urea nitrogen	血中尿素窒素
CKD	chronic kidney disease	慢性腎臓病
CKD-MBD	chronic kidney disease-mineral and bone disorder	慢性腎臓病に伴う骨・ミネラル代謝異常
Ccr	creatinine clearance	クレアチニンクリアランス
Cr	creatinine	クレアチニン
CRP	C reactive protein	C 反応性蛋白
DOPPS	Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study	
eGFR	estimated glomerular filtration rate	推算糸球体濾過量
ESA	erythropoiesis stimulating agent	赤血球造血刺激因子製剤
GFR	glomerular filtration rate	糸球体濾過量
Hb	hemoglobin	ヘモグロビン
HbA1c	hemoglobin A1c	ヘモグロビン A1c (=グリコヘモグロビン)
HD	hemodialysis	血液透析
HDF	hemodiafiltration	血液透析濾過
J-DOPPS	Japan-Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study	
KDIGO	Kidney Disease : Improving Global Outcomes	
KDOQI	Kidney Disease Outcomes Quality Initiative	
PD	peritoneal dialysis	腹膜透析
PTH	parathyroid hormone	副甲状腺ホルモン
QOL	quality of life	生活の質

■次号予告

臨牀透析 11 月号

〈2019 年 11 月 10 日発行予定〉

OPINION

東北大学大学院医学系研究科内部障害学/東北大学病院リハビリテーション部

上月 正博

特集●透析患者の支持療法

Editorial — なぜ支持療法が重要なのか？

- | | | |
|---|--------------------------|---------|
| 1. かゆみ | 浜松医科大学医学部附属病院血液浄化療法部 | 加藤 明彦 |
| 2. 疲労感 | だんの皮膚科クリニック | 段野貴一郎 |
| 3. 低血圧症 | 大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学 | 山田 真介 他 |
| 4. 睡眠障害, むずむず脚症候群, 周期性四肢運動障害 | 湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター | 守矢 英和 他 |
| 5. 食欲不振 | 豊橋メイツ睡眠クリニック | 小池 茂文 |
| 6. 身体機能低下 | 浜松医科大学医学部附属病院血液浄化療法部 | 加藤 明彦 |
| 7. 認知機能低下 | 偕行会名古屋共立病院ウェルネスセンター | 森山 善文 他 |
| 8. 精神心理的な問題 — 血液透析患者における大うつ病性障害の支持的精神療法 | 奈良県立医科大学腎臓内科学 | 鶴屋 和彦 |
| 9. 口腔機能低下 | 美之会庄子内科クリニック精神科 | 大内 雄太 他 |
| 10. 社会的な参加 | 徳島文理大学保健福祉学部口腔保健学科 | 吉岡 昌美 |
| 11. ポリファーマシー, 潜在的に不適切な処方 (PIMs) | 国際医療福祉大学病院予防医学センター・腎臓内科 | 安藤 康宏 |
| 12. 感染症予防 | 兵庫医科大学病院薬剤部 | 木村 健 |
| [特集コラム] | 衆和会長崎腎病院 | 原田 孝司 |
| ・新しい便秘薬の使い分け | 川崎幸病院腎臓内科 | 小向 大輔 他 |
| [連 載] | | |
| ● ケース・スタディ | | 北川 貴之 他 |
| ● 症例による透析患者の画像診断 | | 平塩 秀磨 他 |

(編集の都合により掲載内容が若干変更となることがあります)